

**ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  
Особенности вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
у ВИЧ-инфицированных**

- В соответствии с п. 5.2. рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки.
- Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных препаратов
- Эксперты пришли к соглашению, что ВИЧ-инфицированные пациенты нуждаются в вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) независимо от количества CD4+ Т-лимфоцитов или вирусной нагрузки РНК ВИЧ, поскольку потенциальные преимущества перевешивают потенциальные риски.



# Вакцинация для ВИЧ-позитивных пациентов

**Вакцинация** - единственный способ снизить вероятность инфицирования, а также риски тяжелого течения и смерти от COVID-19.

Вероятность серьезных осложнений после прививки намного меньше, чем после или во время перенесенного COVID-19.

**Решение за Вами, но специалисты в области инфекционных заболеваний предупреждают, что лучшее решение на сегодняшний день - вакцинироваться!**

